

Total No. of printed pages = 9

3 (Sem 1) MAT

2015

MATHEMATICS

(General)

(Classical Algebra and Trigonometry)

Full Marks – 60

Time – Three hours

The figures in the margin indicate full marks  
for the questions.

Answer either in English or in Assamese.

উত্তৰ ইংৰাজী অথবা অসমীয়াত কৰিবা।

PART – I

(Objective-type questions)

1. Answer the following questions :  $1 \times 7 = 7$

তলত দিয়া প্ৰশ্নবোৰৰ উত্তৰ কৰা :

(a) If (যদি)  $b > 0$ , then (তেস্তে)  $\arg(ib) = ?$

(b) For any two complex numbers  $z_1$  and  $z_2$   
 $z_1$  আৰু  $z_2$  দুটা যি কোনো জটিল সংখ্যাৰ বাবে

$$|z_1 + z_2|^2 + |z_1 - z_2|^2 = ?$$

[Turn over

(c) Find atmost how many roots are there for the equation  $x^n - 1 = 0$  ?

$x^n - 1 = 0$  সমীকৰণৰ সৰ্বোচ্চ কিমানটা মূল থাকিব পাৰে ?

(d) In a Gregory's series, for what values of  $\theta$

$$\theta = \tan \theta - \frac{1}{3} \tan^3 \theta + \frac{1}{5} \tan^5 \theta - \dots ?$$

গ্ৰেগ'ৰি শ্ৰেণীৰ,  $\theta$ ৰ কি মানৰ বাবে,

$$\theta = \tan \theta - \frac{1}{3} \tan^3 \theta + \frac{1}{5} \tan^5 \theta - \dots ?$$

(e) Let  $n$  be a positive integer and  $a > b > 0$ . If

$a^{\frac{1}{n}}$  and  $b^{\frac{1}{n}}$  are the positive  $n$ th roots of  $a$  and  $b$  respectively then which of the following is true ?

ধৰা হ'ল  $n$  এটা ধনাত্মক অখণ্ড সংখ্যা আৰু  $a > b > 0$ ।

যদি  $a^{\frac{1}{n}}$  আৰু  $b^{\frac{1}{n}}$  দুটা ক্ৰমে  $a$  আৰু  $b$ ৰ  $n$ তম মূল হয়, তেন্তে তলৰ কোনটো উক্তি সত্য ?

(i)  $a^{\frac{1}{n}} = b^{\frac{1}{n}}$

(ii)  $a^{\frac{1}{n}} > b^{\frac{1}{n}}$

(iii)  $a^{\frac{1}{n}} < b^{\frac{1}{n}}$

(iv) None of the above (ওপৰৰ এটাও নহয়)

(f) If (যদি)  $z = 1 + i$ , then (তেন্তে)  $\arg z = ?$

(g) If the sequence (যদি অনুক্রম)  $\{u_n\}$  is convergent (অভিসৰী হয়) then (তেন্তে)

$$\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = ?$$

### PART - II

2. Answer the following questions :  $2 \times 4 = 8$

তলত দিয়া প্ৰশ্নবোৰৰ উত্তৰ কৰা :

(a) If  $z_1$  and  $z_2$  are two complex numbers, then show that

$$\arg (z_1 z_2) = \arg z_1 + \arg z_2$$

যদি  $z_1$  আৰু  $z_2$  দুটা জটিল সংখ্যা, তেন্তে দেখুওৱা যে

$$\arg (z_1 z_2) = \arg z_1 + \arg z_2$$

(b) If  $\alpha, \beta, \gamma, \delta$  are the roots of the equation  $a_0 x^4 + a_1 x^3 + a_2 x^2 + a_3 x + a_4 = 0$ , find the value of  $\sum \alpha^2$ .

$a_0 x^4 + a_1 x^3 + a_2 x^2 + a_3 x + a_4 = 0$  সমীকৰণৰ মূলকেইটা  $\alpha, \beta, \gamma, \delta$  হলে  $\sum \alpha^2$  ৰ মান নিৰ্ণয় কৰা।

(c) If a, b, c and d be all positive, prove that

$$\frac{a}{b} + \frac{b}{c} + \frac{c}{d} + \frac{d}{a} \geq 4$$

যদি a, b, c আৰু d ধনাত্মক, প্রমাণ কৰা যে

$$\frac{a}{b} + \frac{b}{c} + \frac{c}{d} + \frac{d}{a} \geq 4$$

(d) If  $\{u_n\}$  is a null sequence (i.e.  $u_n \rightarrow 0$ ), then prove that  $\{|u_n|\}$  is also a null sequence.

অনুক্ৰম  $\{u_n\}$  ই যদি শূন্যলৈ অভিসৰণ কৰে, তেন্তে প্রমাণ কৰা যে  $\{|u_n|\}$  অনুক্ৰমটোও শূন্যলৈ অভিসৰণ কৰিব।

### PART - III

(Short answer-type questions)

3. Answer any *three* of the following questions :  
5×3=15

তলৰ যি কোনো তিনিটা প্ৰশ্নৰ উত্তৰ কৰা :

(a) If (যদি)  $x = \cos \alpha + i \sin \alpha$ ,  $y = \cos \beta + i \sin \beta$ , and (আৰু)  $z = \cos \gamma + i \sin \gamma$  and if (আৰু যদি)  $x+y+z=0$ , then show that (তেন্তে দেখুওৱা যে)

$$\frac{1}{x} + \frac{1}{y} + \frac{1}{z} = 0$$

(b) If n is a positive integer, then prove that

যদি n এটা ধনাত্মক অখণ্ড সংখ্যা, তেন্তে প্রমাণ কৰা

$$\frac{2 \cdot 4 \cdot 6 \cdot \dots \cdot 2n}{1 \cdot 3 \cdot 5 \cdot \dots \cdot (2n-1)} > \sqrt{2n+1}$$

(c) If  $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$  are the roots of the equation  $x^n + p_1 x^{n-1} + p_2 x^{n-2} + \dots + p_n = 0$ , find the value of  $\sum \frac{1}{\alpha_1}$  in terms of the coefficients.

$x^n + p_1 x^{n-1} + p_2 x^{n-2} + \dots + p_n = 0$  সমীকৰণৰ মূলকেইটা  $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$  হ'লে,  $\sum \frac{1}{\alpha_1}$  ৰ মান সহগৰ সম্পৰ্কত উলিওৱা।

(d) Show that a convergent sequence can not converge to two distinct limits.

দেখুওৱা যে এটা অভিসাৰী অনুক্ৰমৰ দুটা ভিন্ন সীমা বিন্দু থাকিব নোৱাৰে।

(e) Using comparison test, show that the series  $\sum (\sqrt{n^4+1} - \sqrt{n^4-1})$  is convergent.

কমপেৰিজন পৰীক্ষাৰ সহায়ত দেখুওৱা যে তলৰ শ্ৰেণীটো  $\sum (\sqrt{n^4+1} - \sqrt{n^4-1})$  অভিসাৰী হয়।

PART - IV

Answer either (a) or (b) from each of the following questions :

তলৰ প্ৰতিটো প্ৰশ্নৰ (a) অথবা (b)ৰ উত্তৰ কৰা :

4. (a) (i) Solve by Cardan's method : 6

কাৰ্ডন পদ্ধতিৰে সমাধান কৰা :

$$x^3 - 6x - 9 = 0$$

(ii) Find the condition that the roots of the equation  $a_0x^3 + 3a_1x^2 + 3a_2x + a_3 = 0$  are in arithmetic progression. 4

$a_0x^3 + 3a_1x^2 + 3a_2x + a_3 = 0$  সমীকৰণৰ মূল-কেইটা সমান্তৰ প্ৰগতিত থকাৰ চৰ্তটো উলিওৱা।

(b) (i) Prove that every absolutely convergent series is convergent. Is the converse true? Justify. 4+1=5

প্ৰমাণ কৰা যে প্ৰত্যেক পৰম অভিসাৰী শ্ৰেণী এটা অভিসাৰী। বিপৰীত উক্তিটো সত্যনে? বুজাই দিয়া।

(ii) If  $u_n = \frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+2} + \dots + \frac{1}{2n}$ , show that the sequence  $\{u_n\}$  is monotonic increasing and bounded. 5

$$\text{যদি } u_n = \frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+2} + \dots + \frac{1}{2n},$$

দেখুওৱা যে  $\{u_n\}$  অনুক্রমটো একদিক্ৰমত বৰ্ধমান আৰু পৰিবিদ্ধ।

5. (a) If  $x_1, x_2, \dots, x_n; y_1, y_2, \dots, y_n$  are all real numbers, prove that

$$\left( \sum_{i=1}^n x_i^2 \right) \left( \sum_{i=1}^n y_i^2 \right) \geq \left( \sum_{i=1}^n x_i y_i \right)^2$$

State three separate conditions for which the inequality becomes equality. 7+3=10

যদি  $x_1, x_2, \dots, x_n; y_1, y_2, \dots, y_n$  বাস্তৱ সংখ্যা হয়, তেন্তে প্ৰমাণ কৰা যে

$$\left( \sum_{i=1}^n x_i^2 \right) \left( \sum_{i=1}^n y_i^2 \right) \geq \left( \sum_{i=1}^n x_i y_i \right)^2 \quad \text{অসমতা সমতা}$$

হোৱা তিনিটা ভিন্ন চৰ্ত লিখা।

- (b) (i) State Sandwich theorem. Applying this theorem, show that the sequence  $\{u_n\}$  where

$$u_n = \left[ \frac{1}{(n+1)^2} + \frac{1}{(n+2)^2} + \dots + \frac{1}{(2n)^2} \right]$$

converges to zero. 1+4=5

ছেন্দউইছৰ উপপাদ্যটো লিখা। উপপাদ্যটো প্ৰয়োগ কৰি দেখুওৱা যে  $\{u_n\}$  অনুক্রমটো শূন্যলৈ অভিসৰণ কৰে, য'ত

$$u_n = \left[ \frac{1}{(n+1)^2} + \frac{1}{(n+2)^2} + \dots + \frac{1}{(2n)^2} \right]$$

- (ii) Examine the convergence of the following series : 5

তলৰ শ্ৰেণীটোৰ অভিসাৰিতা পৰীক্ষা কৰা :

$$\frac{x^2}{2} + \frac{2}{3} \cdot \frac{x^4}{4} + \frac{2 \cdot 4}{3 \cdot 5} \cdot \frac{x^6}{6} + \frac{2 \cdot 4 \cdot 6}{3 \cdot 5 \cdot 7} \cdot \frac{x^8}{8} + \dots (x > 0)$$

6. (a) (i) If (যদি)  $\tan \log (x+iy) = a+ib$ , where (য'ত)  $a^2 + b^2 \neq 1$ , prove that (প্ৰমাণ কৰা) 5

$$\tan \log (x^2 + y^2) = \frac{2a}{1 - a^2 - b^2}$$

- (ii) If  $n > 2$  and  $n \in \mathbb{N}$ , then show that

যদি  $n > 2$  আৰু  $n \in \mathbb{N}$ , তেন্তে দেখুওৱা যে

$$\left( \frac{2^n - 1}{n} \right)^2 > 2^{n-1} \quad 5$$

- (b) (i) If  $\tan (x+iy) = u+iv$ , then prove that

যদি  $\tan (x+iy) = u+iv$ , তেন্তে প্ৰমাণ কৰা যে

$$u^2 + v^2 + 2u \cot 2x - 1 = 0$$

$$\text{and } u^2 + v^2 - 2v \cot 2y + 1 = 0 \quad 6$$

- (ii) Show that (দেখুওৱা যে) 4

$$\frac{\pi}{4} = \left( \frac{1}{2} + \frac{1}{5} + \frac{1}{8} \right) - \frac{1}{3} \left( \frac{1}{2^3} + \frac{1}{5^3} + \frac{1}{8^3} \right) + \frac{1}{5} \left( \frac{1}{2^5} + \frac{1}{5^5} + \frac{1}{8^5} \right) - \dots$$